Chasselas rosé loulou

Vass4R07s086-090



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp244

The second secon

Chasselas rosé Loulou 4.22 59 € 07 4 daataahaataahaataal







Miller: 0 1 2 3 4 5 Désignation: Chamelas rose Loulan Clos (Planche 27 Rang S' Souche 9 Vigueur : 3 Date de Véraison : 36 765 Date de Maturité # 6-9.65 +3 Pourriture 2:0 GRAPPE: G-M-P-L-M-C BAIE : TG - G - M - P. 18 X /7 Bl = Gr - (Rs) - Rg - N.Charge : s 1 2 saveur : (8) - m - ar - fox - herb. s 2 0 disc - sph - (11). - Ov. Obov .- cyl - fus. 330 s 43 avec pépins - apyrène s 5 jus : inc. - coloré. Fédoncule : L- M C.

DESIGNATION classes rose Loulou

CLOS 4 PLANCHE 92 RANG SOUCHE 9

Vigueur: 4

PORT: érig - éris - couché

Pédoncule: B - M - C

Millerandage: 0

Date de Véraison: 6.8

Date de Naturité: 18 969 + 4

Pourriture: 2

GRAPPE: G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P: L - M - C

COULEUR: D - Gr - RD - Rg - N

SAVEUR: D - Gr - RD - Rg - N

SAVEUR: D - Gr - RD - Rg - N

SAVEUR: D - Gr - RD - Rg - N

SAVEUR: D - Gr - RD - Rg - N

SAVEUR: D - Gr - RD - Rg - N

SAVEUR: D - Gr - RD - Rg - N

SAVEUR: D - Gr - RD - RD - RD

SAVEUR: D - Gr - RD

SAVEUR: D - GR

DESIGNATION: Charpelos rose Loulon CLOS 4 PLANCHE 22 RANG S SOUCHE 9 Vigueur : 2,5 Port : érig - (1/2 érig - couché. Date de Véraison: 2.8-67 Date de maturité: 30.8.67 0 +2 Pourriture : 0 Pédoncule : L Millerandage : O M - P: D- M - C: BAIE : TG - G- M - P. disc. - sph. - (11) - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 2 avec pépins - apyrène. Jus : inc. - coloré. s 3 s 4 2

Année: 1965 Explacement . 4. 2159 Désign tion Chasselas rose faulou

1	====	! Nombre	======================================	and the transfer of the transf						
!!!!		! total	26,3	!	1	!	!	i	!	!
1	1	1 4	! 4 × !	!	!	!	!	!	!	!
1	2	! 5	131	!	!	1	!	1		
1	3	! faith	1 1	1	!	1	!	!	1	
1	1	! (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!	1	!	!	!	!	
1	-	: 4	i U X i	!	!	!	!	!	!!	!
!	5	16	1 4 x	: ! !===	1					====
			,,	D	le 26	365	-2			

Année: 1966
Es placement . el 4. P22 59 ... Désignation . chasselas rese Loulou

	! Nombre	bre !									
	! total	14-3	!	1	! !	!	!	!	!	men ru	
l seems and	1 9	15 1	!	!	!	!	!	!	1		
2	6	H 1	!	1	!	!	!	1	!		
"	! 4	14 6	!		!	!	!	!	į		
4	! 8	6 L	1	1	!	•	!	!	!		
5	4	14 *	!	!		266	!	:	t i		
	: 		!====		De 1	3-66	11	=======================================	======	-	

Annie: 1967 Explacement ... el 4. P. 22 S. g. ... Désignation chapelas rosé Loulon.

1		! Nombre ! total	!								
!			: 6/3	!	1	!	!	!	!!!	!	
!	1	1 4	11/62	! 1	!	in the second second second second	1	!	!	!	per-dagling
!	2	4	21/3	1 4	!	1	. 1	!	!	!	
!	3	1/2 4	11/5	11	1 -	!	1	!	!	!	
	4		in B	11	1	De: 6/	2/67	!	!	!	
!	5	16 4	14 (53)	1 ×	1	1 (1)	-7!	!	!	!	

Charselas rose Loulou
Véraison à 50 % Temain Print 80 81 4. 22 83 10.8 +45 14.8 +3 17.8 +2 +2,2

Véraison Temain Chambre

H. 22. S3 10.8 +2 13.8 +3 17-8 +4 31-7 +1 42,5

Fertilité Kaille courte 83 84 86

h. 22 S3 10 11 7 3

Floraison 1 1870 86.30 2.6.35 (+5) - 3.6.36 (+4) - 30.5.208 (+6) +5

Chasselas rose Laulou

Désignation :

Emplacement: 4.2259 11

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

- 41 épanoui ① moyon 2 globuloux 3.
- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)- en gouttière 8 autres 9.
- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 oarminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Har 61 Chassilas rose lacilar

Désignation :

Emplacement: 4.22 59 4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux Quite duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvoteux 8 - cotonneux 9.

à limbo plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jauno 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé Q-vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Dist
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 6)

49 - glabre 0 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR!

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo: mai 65

Chasselas rose Loulon

Désignation :

Emplacement: 4,22 59 A. 1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raios 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré (7) - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4,

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

Désignation: chassels rose doulon Emplacement: 4.22 S9

FEUILLE ADULTE.

colonno

- 34 petite 1 noyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobos: plan 1 on gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unio 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6:
- 37 Norvuros : Face supérieure : vorte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 Face inf\(\text{inf\(\text{inf\(\text{verte}\) } \) particlloment rouge 3 onti\(\text{erent rouge} \) 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabro 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiolo/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Renner 7-65

Ty

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno (2) - Petite 3.

24 - Liche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)

25 - A pédoncule horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3)

25 - Axo de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - trrégulière (2)

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obcvoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne(4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A savour noutro 1 - fado 2 - musquéo 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spécialo 7:

31 - A pédicelle long 1' - moyenn2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9:

32 - A bourrelet évident (1)- peu apparent 2.

32 - A pinceau: court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pincoau : coloré - non coloré (9)

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Almeras 8-65.

Dénomination Chassels rosé Loulou Planche 4.22 5 80t6 Rang souche 02.5.4.5 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyer (2), court (3).
: grels (1), fort (2).
: ramiflé (1), peu ramiflé (2). Sarment e adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversa.e: circulaire (i), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (5), cotelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3), ; glabre (2), à épines ou analogues (3), à reils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousso (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuloux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (5), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(1). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeur : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12,65

```
mi Désignation: Chasselas rosé Loulou
No d'ordre :
Origine :
Emplacement: d4 pl 22 89
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. Lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - (1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 3 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8)
17 - Dents : Méd/B
                 ..... 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L:<sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3.
                 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                          :(1)-(2)-(3).
                  Direction
                       : (4) - 5.
                  Forme
                  Médiane/Base : 6 - 7 - (8,
```

Domerque 80

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

3116

Année:2008 grappgen08

Observateur:

CodeIntro: 0Mtp244

NomVar : Cépage non identifié

Nom introduction: Chasselas rosé loulou

Emplacement: Vass4R07s086-090

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe: très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Trillo Porce

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	10		M/3 cdib.	15	
2					
3	12	3/3 4068	14/3 108/10/6	9	
4	10	3dis- 3/3	11/3 60%	б	
5	7	3/3	11 3 Hdib	10	
Moyenne	33		12/3	40	10

+2

Date de	floraison	Taux de	Date de	véraison	Date de	Début
début	moitié (oiv 302)	mouaison % (oiv 501)	début	moitié (oiv 303)	maturité (oiv 304)	aoûtement (oiv 306)
26/5	30/5		24/07	31/07	3/09	

-16/5 Vegétato bep + grande que + 6 La host du clas jihan la 113/5, 23/5

× +1 1/2 1/6 +3

10 a Hole Faure Erronoles.

I.N.R.A. - Domaine de Vassal - version 2003

Formulaire de description 2/8

(stade floraison)

Année : 2008

Code cépage: 0Mtp244

Code introduction:

Nom introduction: Chasselas rosé loulou

Emplacement: Vass4R07s086-

Observateur: TD

090

Bourgeonnement

oiv 001 forme: globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte 7.

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique : absente 1 - en liseré 2 - partout 3.

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5

forte 7 - très forte 9.

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4° feuille détachée) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 3 cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 17 faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1) - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3'moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal:

Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

Profil: étalées 1 - en gouttière 2 - autre 3.

Densité poils couchés face inf. :nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Couleur face sup. : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213.

(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera notée :)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil: plan(1)- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 -

Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216. Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 -

plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233.

Formulaire de description 3/8

(stade floraison)

Année : 2008 Code cépage :

Code introduction: 0Mtp244

Nom introduction: Chasselas rosé loulou

Observateur: TD

Emplacement: Vass4R07s086-090

Rameau herbacé

oiv 006 port : érigé 1 - demi-érigé 3 - horizontal 5) demi-retombant 7 - retombant 9. oiv 351 vigueur rameaux : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 009 couleur face dorsale noeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3?

oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 010 couleur face ventrale noeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible 1 - moyenne 5 - forte 9.

oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence D- présence 9.

oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible 1 - moyenne 5 - forte 9.

oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence 1/2- présence 9.

oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1 - faible 3)moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 016 distribution vrilles: discontinue (2 ou moins) 12- subcontinue ou continue (3 ou plus) 2. oiv 017 longueur vrilles: très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm)/9)

Inflorescence

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 niveau insertion 1° inflorescence: jusqu'au 4° noeud 1 - au-delà du 4° noeud 2.

oiv 153 nombre inflorescence/rameau: 1 ou moins 1 - 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4. oiv 155 inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base : absence 1 - présence 9.

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Surface du rameau herbacé : unje/1 - côtelée 2.

000-10 Villosité spéciale du rameau herbacé : épines ou analogues 1 - poils massifs 2 -aucune 3

000-21 Couleur des vrilles : jaune 1 – rouge clair 2 – rouge foncé 3 – vert 4.

Bouton floral: petit 1 - moyen 2 - gros 3.

Formulaire de description 4 / 8
Observation entre stades de nouaison et de véraison

Année: 200 % Code cépage:

Code introduction: 0Mtp244

Observateur:

Nom introduction : Chasselas rosé loulou

Emplacement: Vass4R07s086-090

-				
_		W 4	CHA	M
_	100 L	M	шка	м
_		ana.	113.2	X.

			LIMBE				
Code	Descripteur		1	3	5	7	9
Oiv 065	Taille		Très petite	Petite	Moyenne	Grande	Très grande
Oiv 067	Forme du limbe		1-Cordiforme	23Cunéiforme	3-Pentagon.	4-Orbicul.	5-Rénif.
Oiv 068	Nombre de lobes	- M - M - M - M - M - M - M - M - M - M	1-1. entière	2-Trois	3-Cinq	4-Sept	5- + de sept
Oiv 069	Couleur face supérieure l	imbe		Vert clair	Vert moven	Vert foncé	
Oiv 070	Pigmentation anthocyanic des nervures, face supérie		1- Nulle	2- Point pétiolaire	Jusqu'à lêre bifurc.	4- Après l ^{ère} bifurc.	
Oiv 071	Pigmentation anthocyanio de nervures, face inférieu		1- Nulle	2- Point pétiolaire	Jusqu'à l'ére bifurc.	4- Après lère bifurc.	
Oiv 074	Profil du limbe		1-Plan	2-En V	3-Involuté	4-Révoluté	5-Tourmenté
Oiv 073	Ondulation du limbe (entr	e nerv I ou II)	Absente				Presente
Oiv 072	Gaufrure du limbe (dépression entre nervures I et	II)	Absente				Présente
Oiv 075	Cloqûre du limbe, face su (relief entre nervures de dernie		Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 084	Densité p. couchés entre ne	rv. face sup.	Nulle al. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 085	Densité p. dressés entre ner	v. face inf.	Nulle at fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 086	Densité p. couchés des nerv	Nulle at. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte	
Oiv 087	Densité p. dressés des nerv.	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte	
Oiv 088	Villosité couchée nerv.princi	Absente				Présente	
Oiv 089	Villosité dressée nerv. princi	Absente				Présente	
Vassal	Densité p. couchés limbe fa	Nulle à f fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte	
Vassal	Densité p. dressés limbe fac		Nulle at. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
		•	PETIOLE				
Oiv 090	Densité poils couchés		Nulleat. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 091	Densité poils dressés		Nulle à t.) fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 093	Longueur pétiole p/r nerv	ure médiane	Beaucoup plus court	Plus court	Égal	Plus long	Beaucoup plus long
	SINUS PETIOLA	AIRE (égalemen	nt observable sur	feuilles d'herbi	er, formulaire	n° 7)	
Oiv 079	Ouverture	1-très ouvert	2) ouvert	3- peu ouvert	4- fermé	5- lobes chevauchants	6- lobes très chevauchants
Oiv 080	Forme de la base		1- en U	2- en accolade	3- en V		
Oiv 81-1	Dent sur le bord		O-Absence	2- Prései	nce assez fréqu	uente de 1 ou 2	2 dents
Oiv 81-2	Base dégarnie		(F) Absence	2- sur 1 côté	3- sur 2 côtés		The state of the s
	SINUS LATERAUX SU	PERIEURS (ég	alement observa		d'herbier, forn	nulaire nº 7)	
Oiv 082	Ouverture		1- absence de sinus	29 ouverts	3- fermés	4- lobes très chevauchants	
Oiv 83-1	Forme		1- en U	2- en accolade	3- en V		
Oiv 83-2	Dent)- Absence	2- Présence	fréquente		
	DENTS (galement obser	vable sur feuille	s d'herbier, form	ulaire n° 7)		
Oiv 076	Forme	1- côtés concaves	(2) côtés rectilignes	3- notations 2+4	4- côtés convexes	5- un côté concave et l'autre convexe	
Oiv 077	Taille		Très petites	Petites	Mogennes	Grandes	Très grandes
Oiv 078	Rapport longueur/largeur		Très courtes	Courtes	Moyennes	Longues	Très longues
	AUTR	E CARACTER	E OBSERVABI	E A CETTE PE	RIODE		
Oiv 501	Taux de nouaison (7 à 14 j.		Très faible (<10%)	Faible (11-30%)	Moyen (31-50%)	Élevé (51-70%)	Très élevé (>80%)

Formulaire de description 5/8 (stade maturité) Observateur: Année: 20 07 Code introduction: 0Mtp244 Code cépage: Emplacement: Vass4R07s086-090 Nom introduction: Chasselas rosé loulou Grappe oiv 202 longueur: très courte (<10 cm) 1 - courte (10-14 cm) 3 - moyenne (14-18 cm) 5) longue (18-25 cm) 7 - très longue (>25 cm) 9. Valeur absolue (en cm.): oiv 203 largeur: très étroite (<5 cm) 1 - étroite (5-10 cm) 3 - moyenne (10-15 cm) 5large (15-20 cm) 7 - très large (>20 cm) 9. Valeur absolue (en cm.): oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9. oiv 206 longueur pédoncule: très court (<3 cm) 1 - court (3-5 cm) 3 - moyen (5-7 cm) 5 long (7-10 cm) 7 - très long (>10 cm) 1 12 cm oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1)- moitié 5 - plus de la moitié 7. oiv 208 forme: cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2 - en entonnoir 3. oiv 209 présence d'un aileron : absent 1 - une à trois ailes 2 - plus de trois ailes 3. Baie oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue Valeur absolue (en mm.): (20-26mm) (7) - très longue (>26mm) 9. oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large Valeur absolue (en mm.): (20-26mm)(§)- très large (>26mm) 9. oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3. oiv 223 forme: aplatie 1 - arrondie 2) - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8. oiv 225 couleur épiderme : vert jaune D- rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6. oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2 oiv 227 pruine : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9. oiv 229 ombilic: peu apparent 1 - apparent 2. oiv 230 coloration de la pulpe : non colorée D - colorée 2. oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée 1 - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe: peu juteuse 1 - juteuse 2. oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7. oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9. oiv 236 saveur : aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - autre 5. oiv 238 longueur pédicelle: très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3- moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyer 3 - difficile 7 - très difficile 9. oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3. oiv 242 longueur pépins: très courts 1 - courts 3 - moyens 5'- longs 7 - très longs 9. 6oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9. oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes 1 - présentes 2.

Vassal: 000-11 axe de la rafle de la grappe : non colore 2 - coloré 1.
000-18 région ombilicale : déprimée 1 - non déprimée 2.
Millerandage : nul à très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - fort 7 - très fort 9.

Formulaire de description 6 / 8 (après chute des feuilles)

GrapGene06

Observateur: TD

Année: 2008 Code cépage: 0

Code introduction: 0Mtp244

Nom introduction: Chasselas rosé loulou Emplacement: Vass4R07s086-090

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3)- aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée/3)

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes/1) - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence ? - présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence 1 - présence 9.

oiv 351 vigueur * : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7- très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5-

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue: 110

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue: 12 ^

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment: absence 1 – partiellement présente 2 – présente 3.

^{*} voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »